



ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

з вирощування
городніх та садових рослин











Малина (літнє та осіннє плодоношення)

Фенологічні фази		Спокій							
Садіння саджанців		Вихід із спокою	Розпукування бруньок	Висування квіткових бутонів, цвітіння	Формування та досягання ягід	Формування та досягання ягід осіннього врожаю		Закінчення вегетації	
Шкочочінні організми	Шкідники		попелиці листкова та пагонова малинова	малиново-сунічний довгоносик, жук малиновий, попелиці, галиця пагонова, кліщ			малинова галиця, стеблова муха		
	Хвороби		пурпура плямистість		сіра гниль, пурпура плямистість, септоріоз		антракноз, пурпура плямистість, сіра гниль, септоріоз		
Бакова суміш	Інсектициди		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л	Лепідоцид-БТУ (70 мл) на 10 л	Актоверм (70мл) на 10 л	Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Лепідоцид-БТУ (70 мл) на 10 л	
	Фунгіциди		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л			Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л	Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л
	Добрива по листі		Азотофіт (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л	ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л		ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л		ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л	Живе Добриво (35 мл) на 10 л/2 сотки
	Гумати			Гуміфренд (35 мл) на 10 л					
	Прилипач		Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами						
	Полив	МікоФренд (10 г) + ХелпРост/Укорінювач (35 мл) на 10 л води/1 сотка		МікоХелп (20 г) + ХелпРост/Укорінювач (35 мл) 10 л води/1 сотка	МікоФренд (10 г) + МікоХелп (20 г) + Гуміфренд (35 мл) 10 л води/1 сотка			МікоХелп (20 г) + МетаВайт (60 г) на 5 л води	












Малина ремонтантна (осіннє плодоношення)

Фенологічні фази		Садіння саджанців	Спокій						Закінчення вегетації
			Вихід із спокою	Ріст кореневих пагонів	Інтенсивний ріст пагонів	Початок росту плодоносних пагонів	Висування бутонів, цвітіння	Формування та досягання ягід	
Шкочодні організми	Шкідники		попелиці листкова та пагонова малинова	малиново-суничний довгоносик, жук малиновий, попелиці, галиця пагонова, кліщ			малинова галиця, стеблова муха		
	Хвороби		пурпурова плямистість		сіра гниль, пурпурова плямистість, іржа		антракноз, пурпурова плямистість, сіра гниль, септоріоз, іржа		
Бакова суміш	Інсектициди		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) + Актонерм (35 мл) на 10 л						
	Фунгіциди		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л	Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л	Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	
	Добрива по листі		Азотофїт (35 мл) ХеллРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л	ХеллРост плодово-ягідні (35 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л	ХеллРост плодово-ягідні (35 мл/10 л)		Живе Добриво (35 мл/10 л)		
	Гумати		Гуміфренд (35 мл) на 10 л						
	Прилипач		Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами						
	Полив	МікоФренд (10 г) + ХеллРост/Укорінювач (35 мл) на 10 л	МікоХелп (20 г) + ХеллРост/Укорінювач (35 мл) на 10 л	МікоФренд (10 г) + Гуміфренд (35 мл) на 10 л			МікоХелп (20 г) + МетаВайт (60 г) на 10 л води		

Малина літнього строку плодоношення

Фенологічні фази		Спокій							
									
Садіння саджанців		Вихід із спокою	Розпукування бруньок	Висування квіткових бутонів, цвітіння	Формування та досягання ягід	Вирізування двохрічних пагонів	Ріст однорічних пагонів, формування плодів бруньок	Закінчення вегетації (із настанням морозів)	
Шкочочінні організми	Шкідники	попелиці листкова та пагонова малинова			малиново-суничний довгоносик, жук малиновий, попелиці, галиця пагонова, кліщ	малинова галиця, кліщі, горіхотворка, малинова стеблова муха			
	Хвороби	пурпура плямистість			сіра гниль, пурпура плямистість	антракноз, пурпура плямистість, сіра гниль, септоріоз			
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Лепідоцид-БТУ (70 мл) + АктOVERM (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л	
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л			Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л	Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л	Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	
	Добрива по листі	АзотФіт (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л			ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л	ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л			
	Гумати				ГуміФренд (35 мл) на 10 л				
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами							
	Полив	МікоФренд (10 г) + ХелпРост/Укоріновач (35 мл) 10л		МікоХелп (20 г) + ХелпРост/Укоріновач (35 мл) на 10 л		МікоХелп (20 г) + ГуміФренд (35 мл) на 10 л води/1 сотка		МікоХелп (20 г) + МетаВайт (60 г) на 5 л води	

Яблуня







Фенологічні фази													
		Зелений конус	Розпукування бруньок	Рожевий бутон	Початок цвітіння	Масове цвітіння	Закінчення цвітіння	Зав'язування плодів, активний ріст	Розвиток плодів	Закінчення росту	Дозрівання плодів	Листопад	
Шкочочинні організми	Шкідники	довгоносики, золотогоз, квіткоїд, листовійки, молі, трубокверти, шовкопряди, білан жилкуватий, листоблішки, попелиця, плодові кліщі					яблуневий пильщик, плодожерка, листовійки, трубокверти, шовкопряди, мінуючі молі, каліфорнійська щитівка (личинки мандрівниці), листоблішки, попелиці, медяниці			плодожерки, листокрутки, мінуючі молі, п'ядуни, листогризучі шкідники, кліщі.			
	Хвороби	борошниста роса, парша, плямистості листків		борошниста роса, парша, плодова гниль, плямистості листків, альтернاریоз									
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксикацилін-БТУ (70 мл) + Актоверм (70 мл) на 10 л				Бітоксикацилін-БТУ (70 мл) на 10 л	Бітоксикацилін-БТУ (70 мл) на 10 л	Лепідоцид-БТУ (70 мл) на 10 л + Актоверм (70 мл) на 10 л		Бітоксикацилін-БТУ (70 мл/10 л)			
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л			
	Добрива по листі	Азотофит (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л			ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л				ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л				
	Гумати					Гуміфренд (35 мл) на 10 л							
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами											
	Полив	МікоФренд (4-6 г/5 л)			МікоХелп (20 г) 10 л/1 сотка			МікоХелп (20 г) + Гуміфренд (35 мл) на 10 л води/1 сотка			МікоХелп (20 г) на 10 л /1 сотка		
	Деструктори	Органік-баланс деструктор (20 мл) на 5 л води								Органік-баланс деструктор (20 мл) + МетаВайт (60 г) на 5 л води. Обприскати рослинні рештки та задискувати			

Зимуючі стадії шкідників і хвороб які знаходяться на листі та інших рослинних рештках



Чорниця високоросла














Фенологічні фази		Спокій									
		Вихід із спокою	Розпукування бруньок	Початок лінійного росту пагонів	Висування квіткових бутонів, цвітіння	Формування та досягання ягід		Закінчення дозрівання ягід	Визрівання тканин	Закінчення вегетації	
Шкочочинні організми	Шкідники	попелиці, галиця пагонова, кліщі				листогризучі шкідники, кліщі					
	Хвороби	муміфікування ягід, сіра гниль, або ботритис (Botrytis)			антракноз (Colletotrichum gloeosporioides), плодові гнилі, чорна плямистість						
Бакова суніш	Інсектициди	Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Актоверм (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л			
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л			Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		
	Добрива по листі	Азотфіт (70 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л				ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л		Живе Добриво (35 мл) на 10 л			
	Гумати					Гуміфренд (35 мл) 10 л					
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами									
	Полив	МікоФренд (4-6 г/5 л) + ХелпРост/Укорінювач (35 мл) 10 л /1 сотка			МікоХелп (20 г) + Гуміфренд (35 мл) на 10 л води/1 сотка			МікоХелп (20 г) + Органік-баланс деструктор (20 мл) + МетаВайт (60 г) на 5 л води			











Слива

Фенологічні фази												
Шкодоочинні організми	Шкідники	щитівки, попелиці, кліщі, молі, листовійки		листогризучі шкідники, довгоносики, попелиці, кліщі		листогризучі гусениці, довгоносики, сливовий пильщик, попелиці, кліщі, товстонижка, плодожерки			сливова і східна плодожерка, листогризучі шкідники, кліщі			
	Хвороби	кокомікоз, моніліоз, клястероспоріоз, плямистості листя, іржа, кишеньковість слив			моніліоз, кокомікоз, плямистості листя, полістигмоз				клястероспоріоз, іржа, плямистості листя, плодова гниль			
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) + Актонерм (70 мл) на 10 л			Актоверм (70 мл) на 10 л				Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) 10 л			
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		
	Добрива по листі	Азотопіт (10 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л			ХелпРост плодово-ягідні (70 мл) на 10 л		ХелпРост плодово-ягідні (70 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л					
	Гумати					Гуміфренд (35 мл) на 10 л						
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами										
	Полив	МікоФренд (4-6 г) на 5 л/1 сотка			МікоХелп (20 г) + Гуміфренд (35 мл) на 10 л/1 сотка			МікоХелп (20 г) + МетаВайт (60 г) на 5 л/1 сотка				
	Деструктори											Органік-баланс деструктор (20 мл) на 5 л води. Обприскати рослинні рештки та задискувати










Груша

Фенологічні фази														
		Набубнявіння бруньок	Розпукування бруньок	Відокремлення бутонів	Рожевий бутон	Масове цвітіння	Закінчення цвітіння	Зав'язування плодів	Розвиток плодів		Дозрівання плодів	Листопад		
Шкодоочинні організми	Шкідники	яблуневий квіткоїд, брунькові довгоносики, букарка, казарка			довгоносики, золотогуз, квіткоїд, листовійки, молі, трубокверти, шовкопряди, листоблішки, попелиця, медяниця, плодові кліщі			яблуневий пильщик, яблунева плодожерка, листовійки, трубокверти, шовкопряди, мінуючі молі, каліфорнійська щитівка [личинки мандрівниці], листоблішки, попелиці, медяниця		плодожерки, кліщі, листокрутки, мінуючі молі, п'ядуни, листогризучі шкідники				
	Хвороби	борошнеста роса, парша, плямистості листків, моніліоз			борошнеста роса, парша, моніліоз, альтернаріоз			борошнеста роса, парша, плямистості листків, альтернаріоз, плодова гниль						
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксикацилін-БТУ (70 мл) + Актонерм (70 мл) на 10 л				Бітоксикацилін-БТУ (70 мл) + Лепідоцид-БТУ (35 мл) на 10 л			Актонерм (70 мл) на 10 л		Лепідоцид-БТУ (70 мл) на 10 л	Бітоксикацилін-БТУ (70 мл) на 10 л	Зимуючі стадії шкідників і хвороб які знаходяться на листі та інших рослинних рештках	
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л				
	Добрива по листі	Азотофіт (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л				ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л			ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л					
	Гумати							Гуміфренд (35 мл) на 10 л						
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біосектицидами												
	Полив	МікоФренд (4-6 г) на 5 л/1 сотка				МікоХелп (20 г) + Гуміфренд (35 мл) на 10 л/1 сотка					МікоХелп (20 г) + МетаВайт (60 г) на 5 л/1 сотка			
	Деструктори													Органік-баланс деструктор (20 мл) на 5 л води. Обприскати рослинні рештки та задискувати

Черешня








Фенологічні фази												
		Набування бруньок	Розпукування бруньок	Рожевий бутон	Масове цвітіння	Закінчення цвітіння	Зав'язування плодів	Розвиток та дозрівання ранніх плодів	Дозрівання пізніх плодів	Закінчення росту	Листопад	
Шкодоочинні організми	Шкідники	щитівки, попелиці, кліщі, молі, листовійки, довгоносики			попелиці, пильщики, кліщі, листогризучі гусениці, довгоносики, вишнева муха (на початку лету і відкладання яєць)			вишнева муха, листогризучі шкідники, пильщики, кліщі				
	Хвороби	кокомікоз, моніліоз, клястероспоріоз		моніліоз, кокомікоз, плямистості листя		клястероспоріоз, плодова гниль, моніліоз, кокомікоз, плямистості листя						
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) + Актоверм (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) + Лепідоцид-БТУ (35 мл) на 10 л		Лепідоцид-БТУ (70 мл) на 10 л	Актоверм (70 мл) на 10 л			
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л			
	Добрива по листі	Азотофіт (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л		ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л								
	Гумати					Гуміфренд (35 мл) 10 л						
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами										
	Полив	МікоФренд (4-6 г/5 л) + Гуміфренд (35 мл) на 10 л						МікоХелп (20 г) + МетаВайт (60 г) на 5 л/1 сотка				
	Деструктори											Органік-баланс деструктор (20 мл) на 5 л води. Обприскати рослинні рештки та задискувати

Персик, абрикос

Фенологічні фази											
		Зелений конус	Розпукування бруньок, рожевий бутон	Цвітіння	Активний ріст пагонів, розвиток плодів	Розвиток плодів	Дозрівання ранніх плодів	Дозрівання пізніх плодів	Закінчення росту	Листопад	
Шкодоочинні організми	Шкідники	щитівки, несправжні щитівки, міль фруктова, попелиці, східна плодожерка			східна плодожерка, фруктова, смугаста міль, попелиці, листомінуючі молі, білан жилкуватий		східна плодожерка, фруктова, смугаста міль				
	Хвороби	кучерявість листків персика, моніліальний опік, клястероспоріоз, плодова гниль			борошнеста роса, плодова гниль, клястероспоріоз		моніліальний опік, кучерявість листя персика, клястероспоріоз, плодова гниль				
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) + Актоверм (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л	Лепітоцид-БТУ (70 мл) + Актоверм (70 мл) на 10 л		Актоверм (70 мл) на 10 л				
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10л			Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л			
	Добрива по листі	Азотофит (35 мл/10 л) + ХеллРост плодово-ягідні (35 мл/10 л)			ХеллРост плодово-ягідні (35 мл/10 л)						
	Гумати	ГуміФренд (35 мл) на 10 л									
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами									
	Полив	МікоФренд (4-6 г/5 л) + ГуміФренд (35 мл) 10 л /1 сотка						МікоХелп (20 г) + МетаВайт (60 г) на 5 л/1 сотка			
	Деструктори	Органік-баланс деструктор (20 мл) на 5 л води									Органік-баланс деструктор (20 мл) на 5 л води. Обприскувати рослинні рештки та задискувати

Зимуючі стадії шкідників і хвороб які знаходяться на листі та інших рослинних рештках








Горіх грецький

Фенологічні фази									
	До розпускання бруньок	Початок розпускання квіткових бруньок	Цвітіння	Початок росту, формування плодів	Активний ріст	Достигання плодів	Закінчення росту, визрівання деревини		
Шкочочинні організми	Шкідники	горіховий бруньковий, горіховий повстятий, галовий та ін. кліщі, щитівки		горіховий бруньковий та галовий кліщі, вільховий листоїд, горіховий пильщик, горіховий довгоносик, горіховий вусач, попелиці (велика горіхова жилкова та горіхова), горіхова плоджерка			кліщі, зимуючі стадії (довгоносики, сисні і листогризучі види)		
	Хвороби	плямистості, борошниста роса			борошниста роса, плодова гниль		плямистість плодів, борошниста роса, плодова гниль		
Бакова суніш	Інсектициди	Актоверм (35 мл/10 л)		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл/10 л)		Лепідоцид-БТУ (35 мл/10 л)		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл/10 л)	
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	
	Добрива по листі	Азофотіт (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л			ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л		ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л		
	Гумати				Гуміфренд (35 мл) на 10 л				
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами							
	Полив	МікоФренд (4-6 г/5 л)		Гуміфренд (35 мл) 10 л/1 сотка			МікоХелп (20 г) + МетаВайт (60 г) + Органік-баланс деструктор (20 мл) на 5 л/1 сотка		










Смородина та порічки

Фенологічні фази		Садіння саджанців	Спокій	Спляча брунька	Розпукування бруньок	Висування квіткових бутонів, цвітіння	Формування та досягання ягід	Закладання і диференціація плодів бруньок	Закінчення росту	Закінчення вегетації
Шкочочінні організми	Шкідники			зимуючі стадії щитівок, кліщів, попелиць, листовійок, смородиновий бруньковий кліщ	попелиці, листкова галова, пильщик жовтий червоно-смородиновий, галиці смородинова пагонова і листкова, брунькова міль		златка смородинова вузькогіла, склівка смородинова, листовійки			
	Хвороби			борошниста роса, антракноз, септоріоз, бокальчата іржа						
Бакова суміш	Інсектициди			Бітоксикацилін-БТУ (70 мл) + Актонерм (70 мл) на 10 л	Бітоксикацилін-БТУ (70 мл) на 10 л	Актоверм (35 мл) + Лепідоцид-БТУ (35мл) на 10 л		Бітоксикацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		
	Фунгіциди			Набір ФітоХелл + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	Набір ФітоХелл + Прилипач на 10 л			
	Добрива по листі			Азофит (35 мл) + ХеллРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л		ХеллРост плодово-ягідні (35 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л				
	Гумати			Гуміфренд (35 мл) на 10 л						
	Прилипач			Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами						
	Полив	Мікофренд (4-6 г) + ХеллРост/Укорінювач (35 мл) на 10 л/1 сотка		МікоХелл (20 г) + ХеллРост/Укорінювач (35 мл) на 10 л/1 сотка	МікоХелл (20 г) + Гуміфренд (35 мл) на 10 л/1 сотка			МікоХелл (20 г) + Органік-баланс деструктор (20 мл) + МетаВайт (60 г) на 5 л води		








Суниця (традиційні сорти)

Фенологічні фази		Спокій		Вихід із спокою		Початок відростання листків та квітконосів		Цвітіння, зав'язування ягід, ріст сланких пагонів		Формування та досягання ягід		Після збирання врожаю (наростання нових листків, укорінення розеток)	
													
Садіння саджанців		кліщі		довгоносики, пильщики, суничний кліщ, сунична листокрутка, комахи цикадки-пінніці, скосарі		озима совка, слимаки, багатоніжки, сунична і стеблова нематода		кліщі, зимуючі стадії (довгоносики, сисні і листогризучі види)					
Шкідливі організми		Шкідники	біла і бура плямистості, борошніста роса,		сіра гниль, біла і бура плямистості, борошніста роса, вертицильозне в'янення, фітофторозна гниль				плямистості, вертицильозне в'янення				
Хвороби		зимуючі стадії (довгоносики, сисні і листогризучі види)		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Актоверм (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л			
Інсектициди		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Актоверм (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л			
Фунгіциди		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л				Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	
Добрива по листі		Живе Добриво (35 мл) на 10 л/1 сотка		Азотофіт (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л				ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л					
Гумати								Гуміфренд (35 мл) на 10 л					
Прилипач		Липосам (8 мл) на 10 л		Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами									
Полив		МікоФренд (4-6 г/5 л) + ХелпРост/Україновач (35 мл) на 10 л води/1 сотка		МікоХелп (20 г) + ХелпРост/Україновач (35 мл) на 10 л води/1 сотка		МікоХелп (20 г) + Гуміфренд (35 мл) на 10 л води/1 сотка				МікоХелп (20 г) + Органік-баланс деструктор (20 мл) + МетаВайт (60 г) на 5 л води			







Виноград

Фенологічні фази											
		Початок розпускання бруньок та росту пагонів	Ріст листків	Початок цвітіння	Активний ріст, завершення цвітіння	Формування ягід	Достигання ягід ранніх сортів	Достигання ягід пізніх сортів	Кінець вегетації		
Шкочочинні організми	Шкідники	павутинний та ін. кліщі, скосарі, листогризучі шкідники			листокрутки, листогризучі шкідники, кліщі, гронова листокрутка (1, 2 покоління)		гронова листокрутка (3 покоління), кліщі, зимуючі стадії (довгоносики, сисні і листогризучі види)				
	Хвороби	мільдю, оїдіум, фомопсис, краснуха			оїдіум, мільдю, чорна плямистість, сіра гниль			оїдіум, мільдю, чорна плямистість, сіра гниль			
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) + Актюверм (70 мл) на 10 л		Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Лепідоцид-БТУ (70 мл) + Бітоксубацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Актюверм (70 мл) на 10 л		Лепідоцид-БТУ (70 мл) на 10 л	
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л	
	Добрива по листі	Азотофит (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л			Азотофит (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л						
	Гумати				Гуміфренд (35 мл) на 10 л						
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами									
	Полив	МікоФренд (4-6 г/5 л)		МікоХелп (20 г) + Гуміфренд (35 мл) + Живе Добриво (35 мл) на 10 л/1 сотка				МікоХелп (20 г) + Органік-баланс деструктор (20 мл) + МетаВайт (60 г) на 5 л води			

Суниця великоплідна (нейтрального дня)

Фенологічні фази		Спокій		Вихід із спокою		Початок відростання листків та квітконосів		Цвітіння, зав'язування ягід, ріст сланких пагонів		Формування та досягання ягід		Після збирання врожаю (наростання нових листків, укорінення розеток)	
													
Садіння саджанців		Вихід із спокою		Початок відростання листків та квітконосів		Цвітіння, зав'язування ягід, ріст сланких пагонів		Формування та досягання ягід		Після збирання врожаю (наростання нових листків, укорінення розеток)			
Шкочочинні організми	Шкідники	зимуючі стадії (довгоносики, сисні і листогризучі види)		кліщі		довгоносики, пильщики, суничий кліщ, сунична листокрутка, комахи цикадки-пінніці, скосарі		озима совка, слимаки, багатоніжки, сунична і стеблова нематода		кліщі, зимуючі стадії (довгоносики, сисні і листогризучі види)			
	Хвороби	біла і бура плямистості, борошнеста роса		сіра гниль, біла і бура плямистості, борошнеста роса, вертицильозне в'янення, фітофторозна гниль				плямистості, вертицильозне в'янення					
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксисабацилін-БТУ (70 мл) на 10 л		Актоверм [35 мл] + Бітоксисабацилін-БТУ [35 мл] на 10 л		Бітоксисабацилін-БТУ (70 мл) на 10 л							
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л			
	Добрива по листі	Живе Добриво (35 мл) на 10 л		Азотопіт (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л		Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост плодово-ягідні (35 мл) на 10 л		Живе Добриво (35 мл) на 10 л/1 сотка					
	Гумати			Гуміфренд (35 мл) на 10 л									
	Прилипач			Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, біофунгіцидами та біоінсектицидами									
	Полив	МікоФренд (4-6 г/5 л) + ХелпРост/Укорінювач (35 мл) на 10 л/1 сотка		МікоХелп (20 г) + ХелпРост/Укорінювач (35 мл) на 10 л/1 сотка		МікоХелп (20 г) + Гуміфренд (35 мл) + Азотопіт (35 мл) або Живе Добриво на 10 л				МікоХелп (20 г) + Органік-баланс деструктор (20 мл) + МетаВайт (60 г) на 5 л води			




Перець солодкий та баклажани

Фенологічні фази									
Календарний строк*		березень - квітень - травень				травень-червень- липень			
Шкідливі організми	Шкідники	личинки хруща, дротяники, колорадські жуки				попелиці, трипси, білокрилки, колорадські жуки		попелиці, білокрилки, колорадські жуки, совки, трипси	
	Хвороби	кореневі гнилі	кореневі гнилі, бура плямистість, септоріоз			суха, біла, бура, чорна плямистості, борошниста роса, сіра гниль		суха, біла, бура, чорна плямистості, сіра гниль, борошниста роса, бактеріальне в'янення, диплодіоз	
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) на 10 л				Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) + Актонерм (70 мл) на 10 л		Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) на 10 л	
	Фунгіциди	Набір Фітоцид + Прилипач на 0,5 л	Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л			Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л	
	Добрива	Азотофит-р (35 мл) на 10 л або Азотофит-т (2 г) або МікоФренд (2-4 г) під кожну рослину при висадці у відкритий ґрунт + МетаВайт (60 г/10 л)				Живе Добриво (35 мл) на 10 л		Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост овочі (35 мл) на 10 л	
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, фунгіцидами та інсектицидами							
Полив		МікоХелп (20 г) на 10 л							
Фенологічні фази									
Календарний строк*		липень			серпень		серпень-вересень		вересень-жовтень
Шкідливі організми	Шкідники	попелиці, трипси, білокрилки, совки			попелиці, трипси, білокрилки				
	Хвороби	суха, біла, бура, чорна плямистості, сіра гниль, бактеріальне в'янення, диплодіоз, борошниста роса, антракноз			суха, біла, бура, чорна плямистості, сіра гниль, бактеріальне в'янення, диплодіоз, борошниста роса, антракноз				
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) на 10 л			Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) + Актонерм (70 мл) на 10 л				
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л			Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		
	Добрива	Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост овочі (35 мл) на 10 л			Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост овочі (35 мл) на 10 л				
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, фунгіцидами та інсектицидами							
Полив		МікоХелп (20 г) на 10 л							
Деструктори		Органік-баланс деструктор (20 мл) + МетаВайт (60 г) на 5 л води. Обприскати рослини решток та задискувати							













Капуста білоголова

Фенологічні фази										
Календарний строк*		лютий-березень	лютий - березень	квітень-травень		червень	липень			
Шкідливі організми	Шкідники	попелиці				білани, попелиці, трипси, білокрилки		попелиці, білокрилки, совки, трипси		
	Хвороби	кореневі гнилі	кореневі гнилі			суха, біла, бура, чорна плямистості		суха, біла, бура, чорна плямистості, сіра гниль, бактеріальне в'янення		
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) + Лепідоцид-БТУ (70 мл) на 10 л				Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) + Актонер (70 мл) на 10 л				
	Фунгіциди	Набір Фітоцид + Прилипач/0,5 л	Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л			Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л		
	Добрива	Азотифіт-р, (35 мл) на 0,5 л або готуєм ґрунтосуміш з Азотифіт (15 г) на 15 кг ґрунту	Азотифіт (35 мл); Укорінювач (35 мл) на 10 л води + МетаВайт (60 г)			Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост овочі (35 мл) 10 л		Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост (35 мл) 10 л		
	Прилипач	Липосам (20-30 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, фунгіцидами та інсектицидами								
Полив		МікоХелп (20 г) на 10 л								
Фенологічні фази										
Календарний строк*		липень - серпень				серпень - вересень		серпень-вересень		вересень-жовтень
Шкідливі організми	Шкідники	попелиці, трипси, білокрилки, совки				попелиці, білокрилки, совки				
	Хвороби	суха, чорна плямистості, бактеріоз				суха, чорна плямистості, бактеріоз				
Бакова суміш	Інсектициди	Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) + Лепідоцид-БТУ (70 мл) на 10 л								
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л				Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л				
	Добрива	Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост овочі (35 мл) на 10 л				Живе Добриво (35 мл) на 10 л				
	Прилипач	Липосам (20-30 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, фунгіцидами та інсектицидами								
Полив		МікоХелп (20 г) на 10 л								
Деструктори		Органік-баланс деструктор (20 мл) + МетаВайт (60 г) на 5 л води. Обприскати рослинні рештки та задискувати								

Томати

Фенологічні фази								
		Висів насіння	Поява справжніх листків	Поява 4-6 листка	Висаджування розсади	Наростання вегетативної маси	Початок цвітіння	
Календарний строк*		березень - квітень			травень	червень- липень		
Шкідливі організми	Шкідники	личинки хруща, дротяники, колорадські жуки				попелиці, трипси, колорадські жуки		попелиці, білокрилки, колорадські жуки, совки, трипси
	Хвороби	кореневі гнілі	кореневі гнілі, бура плямистість (септоріоз)			суха, біла, бура, чорна плямистості, борошниста роса		суха, біла, бура, чорна плямистості, борошниста роса, бактеріальне вяніння, фітофтороз
Баклова суміш	Інсектициди	Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) на 10 л				Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) на 10 л		Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) на 10 л
	Фунгіциди	Набір Фітоцид + Прилипач на 0,5 л	Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л			Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л		Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л
	Добрива	Азотофїт-р (35 мл) на 0,5 л або готуєм ґрунтосуміш з Азотофїт (15 г) на 15 кг ґрунту або МікоФренд (2-4 г)	Азотофїт (35 мл) + Укоріювач ХелпРост (35 мл) на 10л			Живе Добриво (35 мл) + Гуміфренд (35 мл) на 10 л		Живе добриво (35 мл) на 10 л
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, фунгіцидами та інсектицидами						
Полив		МікоХелп (20 г) на 10 л						
Фенологічні фази								
		Формування 1-го плода	Масове цвітіння	Масове плодоношення	Дозрівання плодів	Збирання плодів	Видалення рослинних решток	
Календарний строк*		липень			серпень	серпень-вересень		
Шкідливі організми	Шкідники	попелиці, колорадські жуки, совки			попелиці, колорадські жуки			
	Хвороби	суха, бура, чорна плямистості, сіра гниль, бактеріальне вяніння			суха, біла, бура, чорна плямистості, сіра гниль, бактеріальне вяніння, фітофтороз			
Баклова суміш	Інсектициди	Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) на 10 л			Актоверм (70 мл) на 10 л			
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л			Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л			
	Добрива	Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост овочі (35 мл) на 10 л			Живе Добриво (35 мл) на 10 л			
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, фунгіцидами та інсектицидами						
Полив		МікоХелп (20 г) на 10 л						

Огірки

Фенологічні фази												
Календарний строк*		Висів насіння	Поява сходів - 3-4 справжніх листка квітень - травень		Садіння розсади травень	Наростання вегетативної маси травень-червень- липень			Бутонізація Початок цвітіння			
Шкідливі організми	Шкідники	попелиці			попелиці		попелиці, совки, трипси, павутиний кліщ					
	Хвороби	кореневі гнилі	кореневі гнилі		борошниста роса, сіра гниль, переноспороз		борошниста роса, сіра гниль, бактеріальне в'янення, антракноз					
Баквава суміш	Інсектициди	Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) + Актонерм (70 мл) на 10 л			Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) + Актонерм (70 мл) на 10 л		Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) на 10 л					
	Фунгіциди	Набір Фітоцид + Прилипач на 0,5л	Фітоцид + Прилипач (15 мл/ 10 л)		ФітоХелп + Прилипач (15 мл/10 л)		Фітоцид + Прилипач (15 мл/ 10 л)					
	Добрива	Азотофіт-р. (35 мл) на 0,5 л або готуєм ґрунтосуміш з Азотофіт Т (15 г) на 15 кг ґрунту або МікоФренд (2-4 г)	Азотофіт (35 мл) + Укоріновач (35 мл) на 10 л води		Гуміфренд (35 мл) на 10л		Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост овочі (35 мл) на 10 л					
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л. Застосовується разом з добривами, фунгіцидами та інсектицидами										
Полив		МікоХелп (20 г) на 10 л										
Фенологічні фази												
Календарний строк*		Формування 1-го плода			Масове цвітіння		Кінець цвітіння		Масове плодоношення	Дозрівання плодів	Збирання плодів	Видалення рослинних решток
Календарний строк*		липень			липень - серпень - вересень						вересень-жовтень	
Шкідливі організми	Шкідники	попелиці, трипси, білокрилки, совки, павутиний кліщ			попелиці, трипси, білокрилки							
	Хвороби	суха, біла, бура, чорна плямистості, сіра гниль, бактеріальне в'янення, борошниста роса, антракноз			суха, біла, бура, чорна плямистості, сіра гниль, бактеріальне в'янення, борошниста роса, антракноз							
Баквава суміш	Інсектициди	Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) на 10 л			Бітоксикацілін-БТУ (70 мл) на 10 л							
	Фунгіциди	Набір ФітоХелп + Прилипач на 10 л			Набір Фітоцид + Прилипач на 10 л							
	Добрива	Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост овочі (35 мл) на 10 л			Живе Добриво (35 мл) + ХелпРост овочі (35 мл) 10 л							
	Прилипач	Липосам (8 мл) на 10 л., якщо не застосовувався прилипач з фунгіцидом										
Полив		МікоХелп (20 г) на 10 л										
Деструктори		Органік-баланс деструктор (20 мл) + МетаВайт (60 г) на 5 л води. Обприскати рослинні рештки та задискувати										

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ТМ ЖИВА ЗЕМЛЯ

- Мікробні препарати перед заснуванням обов'язково збовтувати;
- Готувати розчин з препаратів необхідно тільки у день обробки та зберігати не більше 4-х годин в темному прохолодному місці. При цьому використовувати чистий посуд та відстояну воду НЕ хлоровану кімнатної температури.
- Обробку рослин препаратами проводить у безвітряну погоду, вранці або ввечері, уникаючи дії прямих сонячних променів;
- Життєдіяльність бактерій викликає здуття полімерної тари та специфічний запах продукту, але це не свідчить про його непридатність, а навпаки – про підвищену активність – мікроорганізми живі; Зайве повітря періодично видаляти через кришку тари;
- При використанні у баковій суміші мікробних препаратів разом з іншими препаратами необхідно попередньо проводити їх пробне змішування (осад не повинен утворюватися);
- Обов'язково мікробні препарати додавати у бакову суміш останніми і зберігати суміш не більше 4-х годин в затіненому місці;
- Дія мікробних препаратів покращується при використанні їх разом з прилипачем Липосам, який сприяє утриманню препарату на рослинах;
- Липосам, як носій-прилиплювач, застосовують у вигляді водного розчину. Розчинення обов'язково проводять ступінчасто (поступово). Нормовану дозу Липосаму розмішують у воді у співвідношенні (1:1) до однорідного розчину, додаючи воду в Липосам поступово малими дозами;
- Порядок внесення компонентів у бакову суміш наступний: хімічні протруйники, мікроелементи, водний розчин Липосаму, а після ретельного перемішування цих компонентів – вносять біопрепарати. Кінцевий об'єм бакової суміші вказаний в інструкції по застосуванню препарату.



Вирощена продукція не містить шкідливих речовин!